

UMR Nancy-Université - INRA
INRA Agronomie et Environnement Nancy-Colmar
2 avenue de la forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY (FRANCE)

RELEVÉ

Field name : Natural reserve Filsenberg
Station : Oschingen
Commune : Mössingen, Stadt
Subarea : Baden-Württemberg
Farmer :

Code of relevé : DEMO_GERMANY_1
Method of relevé : R%
Date of relevé : 22 June 2010
Relevé area :

Author 1 : TONN Bettina / Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung Aulendorf (D)
Author 2 : /
Author 3 : /
Author 4 : /

Botanical composition

Species	R%
Sol nu	0
Thymus pulegioides L., 1753	20
Rumex acetosa L., 1753	20
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777	20
Prunella vulgaris L., 1753	20
Primula veris L., 1753	20
Plantago media L., 1753	20
Medicago sativa L., 1753	20
Medicago lupulina L., 1753	20
Hippocrepis comosa L., 1753	20
Galium verum L., 1753	20
Festuca rubra L., 1753	20
Euphorbia flavicoma DC., 1813	20
Cerastium fontanum Baumg., 1816	20
Carex montana L., 1753	20
Carex flacca Schreb., 1771	20
Campanula rotundifolia L., 1753	20
Bromus erectus Huds., 1762	20
Briza media L., 1753	20

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868	20
Alchemilla vulgaris L., 1753	20
Achillea millefolium L., 1753	20
Holcus lanatus L., 1753	11
Trifolium pratense L., 1753	8
Lotus corniculatus L., 1753	8
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	7
Trifolium spadiceum L., 1755	6
Leontodon hispidus L., 1753	4
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	4
Anthoxanthum odoratum L., 1753	4
Trifolium campestre Schreb., 1804	3
Onobrychis viciifolia Scop., 1772	3
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	3
Plantago lanceolata L., 1753	2
Centaurea scabiosa L., 1753	2
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812	1
Thesium pyrenaicum Pourr., 1788	1
Scabiosa columbaria L., 1753	1
Sanguisorba minor Scop., 1771	1
Salvia pratensis L., 1753	1
Rhinanthus minor L., 1756	1
Phyteuma orbiculare L., 1753	1
Leucanthemum vulgare Lam., 1779	1
Dactylis glomerata L., 1753	1
Campanula glomerata L., 1753	1
Anthyllis vulneraria L., 1753	1
Centaurea jacea var. nigra	0.01
Viola riviniana Rchb., 1823	0.01
Trifolium repens L., 1753	0.01
Tragopogon pratensis L., 1753	0.01
Ranunculus bulbosus L., 1753	0.01
Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775	0.01
Polygala vulgaris L., 1753	0.01
Muscari botryoides (L.) Mill., 1768	0.01
Linum catharticum L., 1753	0.01
Hieracium pilosella L., 1753	0.01
Festuca ovina L., 1753	0.01
Carex caryophyllea Latourr., 1785	0.01
Avenula pratensis (L.) Dumort., 1868	0.01

Agronomical value

Pastoral Value (/100) : 46.9

Forage categories	
Graminées médiocres	24.21
	12.41
Diverses Médiocres	12.06
Assez Bonnes graminées	11.2
Très bonnes légumineuses	11.01
Assez Bonnes légumineuses	10.4
Bonnes graminées	8.2
Diverses fourragères	5.6
Diverses non fourragères	2.84
Très bonnes graminées	1
Bonnes légumineuses	0.2

Fonctionnal types	
B	28
	15.43
A	15
b	1
C	0.41

Ecological value

Species richness	58
Number of oligotrophic species	24
Contribution of oligotrophic species	44.2
Shannon diversity index	4.25
Shannon equitability index	1.04
Simpson diversity index	0.91
Simpson equitability index	1.0
Red list : number of disappeared species	0
Red list : number of species probably disappeared	0
Red list : Number of endangered species	0
Red list : Number of vulnerable species	0
Red list : Number of rare species	0
Total number of red list species	0