

UMR Nancy-Université - INRA  
INRA Agronomie et Environnement Nancy-Colmar  
2 avenue de la forêt de Haye  
54500 VANDOEUVRE LES NANCY (FRANCE)

RELEVÉ FLORISTIQUE

Parcelle : Natural reserve Filsenberg  
Station : Oschingen  
Commune : Mössingen, Stadt  
Département : Baden-Württemberg  
Exploitant :

Code du relevé : DEMO\_GERMANY\_1  
Méthode de relevé floristique : R%  
Date du relevé : 22 June 2010  
Surface du relevé :

Auteur 1 : TONN Bettina / Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung Aulendorf (D)  
Auteur 2 : /  
Auteur 3 : /  
Auteur 4 : /

Composition botanique

Espèces	R%
Sol nu	0
Thymus pulegioides L., 1753	20
Rumex acetosa L., 1753	20
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777	20
Prunella vulgaris L., 1753	20
Primula veris L., 1753	20
Plantago media L., 1753	20
Medicago sativa L., 1753	20
Medicago lupulina L., 1753	20
Hippocrepis comosa L., 1753	20
Galium verum L., 1753	20
Festuca rubra L., 1753	20
Euphorbia flavicoma DC., 1813	20
Cerastium fontanum Baumg., 1816	20
Carex montana L., 1753	20
Carex flacca Schreb., 1771	20
Campanula rotundifolia L., 1753	20
Bromus erectus Huds., 1762	20
Briza media L., 1753	20

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868	20
Alchemilla vulgaris L., 1753	20
Achillea millefolium L., 1753	20
Holcus lanatus L., 1753	11
Trifolium pratense L., 1753	8
Lotus corniculatus L., 1753	8
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	7
Trifolium spadicum L., 1755	6
Leontodon hispidus L., 1753	4
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	4
Anthoxanthum odoratum L., 1753	4
Trifolium campestre Schreb., 1804	3
Onobrychis viciifolia Scop., 1772	3
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	3
Plantago lanceolata L., 1753	2
Centaurea scabiosa L., 1753	2
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812	1
Thesium pyrenaicum Pourr., 1788	1
Scabiosa columbaria L., 1753	1
Sanguisorba minor Scop., 1771	1
Salvia pratensis L., 1753	1
Rhinanthus minor L., 1756	1
Phyteuma orbiculare L., 1753	1
Leucanthemum vulgare Lam., 1779	1
Dactylis glomerata L., 1753	1
Campanula glomerata L., 1753	1
Anthyllis vulneraria L., 1753	1
Centaurea jacea var. nigra	0.01
Viola riviniana Rchb., 1823	0.01
Trifolium repens L., 1753	0.01
Tragopogon pratensis L., 1753	0.01
Ranunculus bulbosus L., 1753	0.01
Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775	0.01
Polygala vulgaris L., 1753	0.01
Muscari botryoides (L.) Mill., 1768	0.01
Linum catharticum L., 1753	0.01
Hieracium pilosella L., 1753	0.01
Festuca ovina L., 1753	0.01
Carex caryophyllea Latourr., 1785	0.01
Avenula pratensis (L.) Dumort., 1868	0.01

## Valeur agronomique

Valeur pastorale sur 100 : 46.9

Catégories fourragères	
Graminées médiocres	24.21
	12.41
Diverses Médiocres	12.06
Assez Bonnes graminées	11.2
Très bonnes légumineuses	11.01
Assez Bonnes légumineuses	10.4
Bonnes graminées	8.2
Diverses fourragères	5.6
Diverses non fourragères	2.84
Très bonnes graminées	1
Bonnes légumineuses	0.2

Type fonctionnel	
B	28
	15.43
A	15
b	1
C	0.41

## Valeur écologique

Richesse floristique	58
Nombre d'espèces oligotrophes	24
Contribution des espèces oligotrophes	44.2
Indice de diversité de Shannon	4.25
Indice d'équitabilité de Shannon	1.04
Indice de diversité de Simpson	0.91
Indice d'équitabilité de Simpson	1.0
Liste rouge : nombre d'espèces éteintes	0
Liste rouge : nombre d'espèces présumées éteintes	0
Liste rouge - nombre d'espèces en danger	0
Liste rouge - nombre d'espèces vulnérables	0
Liste rouge - nombre d'espèces rares	0
Nombre d'espèces sur liste rouge	0